



prunella

**zpravodaj
oblastní
ornitologické sekce
při Správě Krkonošského
národního parku
ve Vrchlabí**

1990

XVI. ročník

O B S A H

RNDr. Petr Miles

Zpráva z činnosti sekce v roce 1990 2

Přehled ornitologických pozorování
v roce 1990 ?

RNDr. Petr Miles

Souhrn publikací v Prunelle v letech
1975-1989 16

RNDr. Jiří Flousek

Početnost vybraných druhů ptáků v Krko-
noších 22

RNDr. Jiří Flousek

Pozor na budnička zeleného (*Phylloscopus*
trochiloides) v Krkonoších ! 24

Martin Lejdar

Moje zkušenosti s odchovem ptačích mlá-
ďat (drozd zpěvný, konipas horský) 26

ZPRÁVA Z ČINNOSTI SEKCE V ROCE 1990

V roce 1990 se činnost sekce zaměřovala většincu na obvyklé, dlouho trvající úkoly.

Při kroužkování ptáků bylo označeno 1375 ptáků v 66 druzích, z čehož asi polovinu tvořili mladí ptáci.

Nejúspěšnějším kroužkovatelem byl opět L.Hlavatý (689 ptáků v 50 druzích), který se zaměřil zejména na ťuhýky obecné a budníčky lesní. Za pozornost stojí zvláště 113 modráčků tundrových, na které se specializuje Ing.B.Chutný. Kroužkováním mláďat v budkách bylo dosaženo vysokého počtu okroužkovaných sýkor uhelníčků a lejsků černohlavých (drž. P.Miles), specializace přináší úspěchy i v případě strakapoudů velkých (J.Grúz). Z velkých ptáků byli kroužkováni na hnizdech čápi černí (5), z dravců a sov zejména poštolka obecná (22) a puštík obecný (23) a poprvé i 3 krkavci velcí. Ze zimních hostů se podařilo okroužkovat 27 brkoslavů severních (Hlavatý, Miles). Celkové výsledky kroužkování jsou uvedeny na str. 6-7.

V příštích letech by se mělo více pozornosti věnovat hýlu rudému, kosu horskému a čečetce zimní, pro jejichž sledování jsou v oblasti Krkonoše velmi příznivé podmínky, přičemž o jejich tahových cestách je dosud známo jen velmi málo.

Na souhrnu ornitologických pozorování se podílelo 28 pozorovatelů, kteří poskytli údaje o 105 druzích ptáků.

Za pozornost stojí zejména výskyt kormoránů velkých v Hostinném, kajky mořské ve Vrchlabí, orla kříklavého na Rýchorách, orla skalního u Sněžky, luháka červeného ve Starých Bukách, motáka lužního v Prosečné, z drobných ptáků pak především opětovný výskyt zpívajícího budníčka zeleného (již po více let na stejných lokalitách). Docházela hlášení o výskytu tetřeva hlušce (patrně výsledek reintrodukce), místy se zvyšují stavy tetřívků obecných, byla zaznamenána i volání křepelky polní. Na více místech než v předcházejících letech se ozýval chřástal polní, z bahňáků byl častější kulík říční a vodouš kropenatý. Zvyšuje se počet budek

obsazených puštíkem obecným, vyhnízdili v nich úspěšně i kalous ušatý a poštolka obecná, v budec hnízdil i kruti-hlav obecný. Z převců stojí za zmínku zimní invaze orkosařava severního, velmi časný přílet i hnízdění některých žuhů, zimní výskyt zvonohřeba zahradního a pěnkavy obecné, vysokohorský výskyt dlasla růstozobého, strnada zahradního a konipasa lučního a kářist nočetních stavů a doklal o vyhnízdění krkavce velkého.

Celkově lze označit rok 1990 za rok na ptáky bohatý, s mimochodem časným příletem, úspěšným hnízděním a pronikáním četných druhů do vyšších horských poloh.

Nejvíce ornitologických pozorování zaznamenali dr. J. Flousek, dr. P. Miles, Z. Macháček, M. Mareček a J. Grůz (viz přehled na str. 7- 16).

Pokračovalo vyvěšování a kontroly ptačích budek. Na území Krkonošského národního parku činilo obsazení 130 kontrolovaných sýkorníků ptáky 59,2 %, z toho na Horních Mísečkách 45 % (60 budek), ve Strážném nad Křiby celou boudami 60 % (30 budek) a na Rýchorách 80 % (40 budek). Druhové zastoupení ptáků v těchto budkách: sýkora uhelníček 28,6 %, sýkora koňadra 26,0 %, sýkora bez druhového určení 14,0 %, lejsek černohlavý 23,4 %, brhlík lesní 5,2 % a zelený zahradní 2,6 %. Kromě ptáků byli v budkách registrováni i čmeláci a pláštíci lískoví a jen malá část jich byla zcela neosídlených.

Při výzkumu populační dynamiky a sezónní proměnlivosti ptáků na Horních Mísečkách bylo od května do srpna 1990 odchyceno 309 ptáků ve 25 druzích. Ze zajímavějších úlovků je možné jmenovat sýce rousného a rákosníka zpěvného, proti předchozím ročníkům byli na enklávě Horních Míseček přítomni i stehlíci obecní. Průměr 2,68 odchycených ptáků za jeden den do jedné sítě byl nejvyšší za celé devítileté sledované období.

Z dalších činností pokračuje sčítání ptáků na transektech (Flousek, Miles), výzkum šplhavců (Grůz), zimní sčítání dravců v liniích (Grůz, Flousek, Materna), sčítání vodních ptáků na Labi (Grůz), aj.

K záslužné činnosti členů sekce náleželo zhotovení dvou velkých umělých hnizd pro čápy v zámeckém parku Správy KRNAP ve Vrchlabí (Grúz, Kalenský, Miles). Čápi jsou zde chováni jako zkrotlí jedinci se zkrácenými křídly, často jsou však přítomni i volně žijící, kteří se ke zkrotlým přidružují. Děje se tak v případě čápa bílého i čápa černého a oba druhy by mohly v umělých hnizdech zahnízdit.

Nevýjivu významnou činností Správy KRNAP, související s ornitologií, bylo opětné převzetí odchovny tetřeva hlušce na Rýchorách (k 1.1.1990) od Východočeské zoologické zahrady ve Dvoře Králové n.L., které byla v posledních letech svěřena. S chovem tetřeva hlušce bylo v Krkonoších započato již v r. 1977 a jeho dosavadním výsledkem byla reintrodukce 68 ks odchovaných tetřevů do volné přírody. Nejzávažnějším problémem chovu je pronikání kun do odchovných volier. Stav chovného materiálu činil ke konci r. 1990 10 kohoutů a 12 slepic, včetně toho roku odchovaných jedinců, zbytek byl zlikvidován kunami. Na případné pomoci při odchovu a zvláště pak při sledování reintrodukovaných jedinců by se členové ornitologické sekce mohli výrazně podílet.

Významnou akcí v r. 1990 byl i pro krkonošské ornitology celostátní ornitologický aktiv v České Skalici (5.-7.10.1990) zaměřený na výzkumy ptačích populací, na kterém bylo referováno i o ornitologickém dění v Krkonoších. Dr. P.Miles zde podal zprávu o dosavadním výzkumu populační dynamiky a sezónní proměnlivosti ptáků na H.Mísečkách, Ing.B.Chutný o svých vynikajících výsledcích výzkumu hnizdní populace modráčka tundrového v Krkonoších, Dr.J.Flousek o kvantitativních výzkumech ptáků. První dva referáty vydou tiskem ve sborníku Panurus 3.

V roce 1990 bylo zaznamenáno i několik zajímavějších zpětných hlášení okroužkových ptáků. Tak J.Grúz chytil na výra poštolku s cizím kroužkem, P.Fišer nalezl na vrchlabském hřbitově kroužek E - 71430 Vogelwarte Rositten Germania. V r. 1990 bylo kontrolováno v Krkonoších 23 dřívě kroužkovaných modráčků tundrových (35 % návratnost z r.

1989) a na Pančavské louce se dokonce podařilo kontrolovat hnizdící samici, která byla kroužkovaná na jarním tahu 3. 4. 1990 u rybníka Švarcenberk v jižních Čechách (Chutný). Zpětným odchytem byla prokázána stálost hnizdní populace sýkory chelnička ve vysokých polohách Krkonoš a hýl obecný kroužkovaný v zimním období v NSR byl zastižen v době hnizdění na H. Misečkách.

Knihovna Krkonošského muzea ve Vrchlabí byla obohacena o rakouská ornitologická periodika: Egretta (časopis rakouské ornitologické společnosti), Monticola (sborník mezinárodní skupiny pro alpskou ornitologii) a ochranářský časopis Vogelschutz in Österreich. Z nich zejména Monticola je svým zaměřením pro členy naší sekce blízká. Byla dohodnuta trvalá výměna těchto periodik za nás zpravodaj Prunella.

Pokračovala spolupráce s odd. biologické produkce Správy KRNAP, pro kterou byli odchyceni drobní ptáci do voliéř. Do modelu horského potoka v expozici Kámen a život ve vrchlabském muzeu byl úspěšně od mláděte odchován konipas horský (M. Lejdar).

Výroční členská schůze sekce se uskutečnila ve Vrchlabí 23.2.1991 za účasti 26 osob. Kromě obvyklé výroční zprávy s uvedením výsledků kroužkování a význačných ornitologických pozorování (Miles) byla podána informace o stavu mapování hnizdního rozšíření ptáků a početnosti hnizdních populací na území KRNAP (Flcusek). Následovala přednáška s diapozitivy Ptáci Alp (Miles), na které dominovaly zajímavosti ze Salzburgu (hnizdění supa bělohlavého v zoologické zahradě ve volnosti na skalách) a Innsbrucku (úspěšný chov většiny horských druhů ptáků v Alperzoo). Zajímavé bylo i pozorování a fotodokumentace hnizdní zdivočelé populace papuška *Psittacus crameri* (alexandr Kramerův) v městském parku v Innsbrucku. V další přednášce Dravci a sovy Náchodská obeznámil přítomné dokonale s témito atraktivními zástupci naší avifauny vedoucí specializované skupiny pro výzkum dravců a sov Východočeské pobočky České společnosti ornitologické Tomáš Diviš.

Členská základna sekce činila v r. 1990 38 členů, nově byl přijat Michal Pokorný z Vítkovic v Krkonoších.

Za nejlepší členy sekce, kteří od Správy KRNAP odkazeli odměnu ve formě bezplatného celoročního zasílání časopisu Krkonoše, byli pro rok 1990 vyhodnoceni P.Fišer, Dr. J.Flousek, J.Grúz, Dr.K.Harant, L.Hlavatý, Ing.J.Kalenšký, M.Mareček, J.Materna, Fr.P.Miles a M.Němec.

PTÁCI OKROUŽKOVÁNÍ V OBLASTI KRKONOŠ V ROCE 1990
(nevzletná mláďata, létající ptáci, celkový počet)

| | | | |
|--|-----|----|-----|
| 1. Čáp černý (<i>Ciconia nigra</i>) | 5 | - | 5 |
| 2. Krahujec obecný (<i>Accip. nisus</i>) | - | 9 | 9 |
| 3. Jestřáb lesní (<i>A. gentilis</i>) | 2 | - | 2 |
| 4. Káně lesní (<i>Buteo buteo</i>) | 4 | -- | 4 |
| 5. Poštolka obecná (<i>F. tinminculus</i>) | 20 | 2 | 22 |
| 6. Puštík obecný (<i>Strix aluco</i>) | 19 | 4 | 23 |
| 7. Sýc rousný (<i>Aegolius funereus</i>) | - | 1 | 1 |
| 8. Kalouš ušatý (<i>Asio otus</i>) | 2 | -- | 2 |
| 9. Ledňáček říční (<i>Alcedo atthis</i>) | - | 1 | 1 |
| 10. Strakapoud velký (<i>Dendr. major</i>) | 38 | 19 | 57 |
| 11. Lejsek šedý (<i>Muscicapa striata</i>) | 3 | 3 | 6 |
| 12. L. černohlavý (<i>Fic. hypoleuca</i>) | 72 | 2 | 74 |
| 13. Pěnice vlašská. (<i>Sylvia nisoria</i>) | 5 | - | 5 |
| 14. P. černohlavá (<i>S. atricapilla</i>) | - | 65 | 65 |
| 15. P. hnědokřídlá. (<i>S. communis</i>) | 6 | 14 | 20 |
| 16. P. pokřovní (<i>S. curruca</i>) | 8 | 1 | 9 |
| 17. P. slavíková. (<i>S. borin</i>) | 9 | 21 | 30 |
| 18. Budníček menší (<i>Ph. collybita</i>) | - | 24 | 24 |
| 19. B. větší (<i>Phyllosc. trochilus</i>) | - | 5 | 3 |
| 20. B. lesní (<i>Ph. sibilatrix</i>) | 44 | 15 | 59 |
| 21. Sedmihlásek hajní (<i>H. icterina</i>) | 4 | 6 | 10 |
| 22. Rákosník zpěvný (<i>Acr. palustris</i>) | - | 1 | 1 |
| 23. Králíček obecný (<i>Reg. regulus</i>) | - | 6 | 6 |
| 24. Drozd kvíčala (<i>Turd. pilaris</i>) | 4 | -- | 4 |
| 25. D. brávník (<i>Turdus viscivorus</i>) | 3 | 3 | 6 |
| 26. D. zpěvný (<i>T. philomelos</i>) | - | 1 | 1 |
| 27. Kos černý (<i>T. merula</i>) | - | 3 | 3 |
| 28. Bramborníček hnědý (<i>S. rubetra</i>) | - | 4 | 4 |
| 29. Červenka obecná (<i>Erioth. rubecula</i>) | 6 | 29 | 35 |
| 30. Modráček tundrový (<i>Lúsc. s. svetli</i>) | 85 | 28 | 113 |
| 31. Rehek zahradní (<i>Ph. phoenicurus</i>) | 7 | 5 | 12 |
| 32. R. domácí (<i>Phoenicurus ochruros</i>) | 8 | 42 | 50 |
| 33. Pěvuška modrá (<i>Prun. modularis</i>) | - | 24 | 24 |
| 34. Skorec vodní (<i>Cinclus cinclus</i>) | - | 2 | 2 |
| 35. Střízlik obecný (<i>Tr. troglodytes</i>) | 6 | - | 6 |
| 36. Tuhýk šedý (<i>Lanius excubitor</i>) | - | 2 | 2 |
| 37. Ť. obecný (<i>L. collurio</i>) | 182 | 21 | 203 |
| 38. Sýkora koňadra (<i>Parus major</i>) | - | 4 | 4 |
| 39. S. modřinka (<i>P. caeruleus</i>) | - | 3 | 3 |
| 40. S. uhelníček. (<i>P. ater</i>) | 87 | 8 | 95 |

| | | | |
|---|-----|-----|------|
| 41. Sýkora parukářka (<i>Parus cristatus</i>) | 1. | 1 | 2 |
| 42. S. babka (<i>P. palustris</i>) | - | 6 | 6 |
| 43. S. lužní (<i>P. montanus</i>) | - | 19 | 19 |
| 44. Mlynařík dlouhoocasý (<i>A. caudatus</i>) | - | 4 | 4 |
| 45. Brkoslav severní (<i>Bomb. garrulus</i>) | - | 27 | 27 |
| 46. Vlaštovka obecná (<i>Hirundo rustica</i>) | - | 8 | 8 |
| 47. Jiřička obecná (<i>Delichon urbica</i>) | 10 | 12 | 22 |
| 48. Brhlík lesní (<i>Sitta europaea</i>) | 23 | 1 | 24 |
| 49. Šoppálek dlouhoprstý (<i>C. familiaris</i>) | 6 | 2 | 8 |
| 50. Dlask tlustozobý (<i>C. coccothraustes</i>) | - | 1 | 1 |
| 51. Stehlík obecný (<i>C. carduelis</i>) | - | 67 | 67 |
| 52. Čížek lesní (<i>Carduelis spinus</i>) | - | 34 | 34 |
| 53. Konopka obecná (<i>C. cannabina</i>) | 4 | - | 4 |
| 54. Čečetka zimní (<i>C. flammea</i>) | - | 9 | 9 |
| 55. Zvonohlík zahradní (<i>S. serinus</i>) | - | 4 | 4 |
| 56. Hýl obecný (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>) | - | 14 | 14 |
| 57. Křivka obecná (<i>Loxia curvirostra</i>) | - | 1 | 1 |
| 58. Pěnkava obecná (<i>Fringilla coelebs</i>) | - | 54 | 54 |
| 59. Strnad obecný (<i>Emberiza citrinella</i>) | 9 | 17 | 26 |
| 60. Linduška lesní (<i>Anthus trivialis</i>) | - | 5 | 5 |
| 61. L. lužní (<i>A. pratensis</i>) | 2 | 1 | 3 |
| 62. Konipas horský (<i>Motacilla cinerea</i>) | 3 | 8 | 11 |
| 63. K. bílý (<i>M. alba</i>) | - | 9 | 9 |
| 64. Krkavec velký (<i>Corvus corax</i>) | 3 | - | 3 |
| 65. Sojka obecná (<i>Garrulus glandarius</i>) | - | 1 | 1 |
| 66. Ořešník kropenatý (<i>N. caryocatactes</i>) | - | 2 | ? |
| Celkem | 690 | 685 | 1375 |

RNDr. Petr Miles
Správa KRNAP Vrchlabí

PŘEHLED ORNITOLOGICKÝCH POZOROVÁNÍ V ROCE 1990

Potápka malá (*Podiceps ruficollis*) - 10.IV.90, Staré Buky, 3 páry, tok. (Mareček). 20.IV., Vrchlabí, rybník u letiště, 1 samec (Flousek). 28.IV., tamtéž, 2 ex. (Macháček). 27.IV., Vrchlabí, Výsplachy, pozorován páru. nález hnizda se 2 vejci. Tamtéž 5.V. 4 vejce a 20.V. 2 vyvedená mláďata (vše Macháček). 3.VII., Dolní Lánov, rybník Kábrt, samice s jedním mládětem (Grůz).

Kormorán velký (*Phalacrocorax carbo*) - 8.III., Hostinné, Hlinák, prelet hejna 66 ex. od jihu k severu. Let v nepravidelném klínu, který se neustále měnil. Vytvářely se 2 až 3 samostatné klíny, které se opět spojovaly, jednotliví ptáci prováděli prudké nálety k zemi (Grůz).

Volavka popelavá (*Ardea cinerea*) - 12.III., Vrchlabí, rybník u letiště, 8 ex. (Flousek). 3.VII., Dolní Lánov, prostřední rybník, 1 ex., po půlhodině přelétl na rybník Kábrt (Grůz). 11.VII., Stříbrná bystrina, 1 ex. (Chutný). 28.VII., Staré Buky, přelet 1 ex. (German). 25.XI., Dolce,

1 ex. na vypuštěném rybníce (German). 22.XII., Klášterská Lhota, 2 ex. na smrcích v stráni nad Labem, 26.XII., přelet 1 ex. ve směru D.Lánov-Fořt (obojí Grúz).

Čáp bílý (Ciconia ciconia) - Na okrese Trutnov se vyskytuje 4 čápi hnizda: Benhartice, 512 m n. m., založeno patrně již v r. 1950 na vysokém komíně státních statků čp. 138. Komín je vysoký cca 20 m, hnizdo je na komíně dodnes. V posledních letech zde čápi úspěšně hnizdili v r. 1982 (2 mláďata) a v r. 1987 (4 mláďata). Pilníkov, hnizdo postaveno na vysokém komíně slévárny v r. 1988. Bylo však bezohledně strženo v hnizdní době, prý i s násadou, takže čápi odletěli. V r. 1989 zaměstnanci JZD postavili čápům na železném sloupu umělou podložku pro hnizdo, ale čápi ji nepřijali a nepřistáli ani v r. 1990. Vlčice, 367 m n. m., v r. 1983 postavili čápi hnizdo na komíně rozestavěné prodejny Jednoty. V r. 1984 si postavili hnizdo na staré olší, kam jim připravili občané starou pneumatiku jako podložku pro hnizdo. Olše stojí u potoka nedaleko stavění čp. 19. V únoru 1990 bylo hnizdo vichřicí shozeno. Proto občané postavili na tomtéž stromě novou podložku pro hnizdo, kterou čápi přijali a úspěšně vyhnizdili, podobně jako ve dvou předchozích letech (počet mláďat: 3, 2, 2). Žireč, v r. 1982 si postavili čápi hnizdo na komíně bývalého pivovaru, kam jim občané dali jako podložku kolo od vozlu. Od té doby čápi hnizdí na komíně, který je prý vysoký jen 12 m, každoročně a úspěšně mimo rok 1986, kdy bylo obsazeno jen lichým čápem. Počet mláďat v hnizdě se postupně zvyšoval: 2, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5 (vše B.Rejman, vedoucí skupiny pro výzkum, ochranu a evidenci čápů Východočeského kraje).

Čáp černý (Ciconia nigra) - 19.III., Čermná, 2 ex., tamtéž 1.VI. okroužkováno v hnizdě 5 pull. (Grúz). 9.V., Rýchory, přelet 1 ex. od pralesa (Hofmann). 19.V., Mladé Buky, směr Rýchory, přelet 2 ex. (Balcar). 23.V., Pilníkov, hnizdo s mláďaty (Mareček). 30.V., Rudník-Javorník, 1 ex. u potoka (Nejsnak). 23.VII., Staré Buky, přelet 1 ex. (German).

Labuť velká (Cygnus olor) - 4.I., Vrchlabí, 4 ex. kroužily nad městem (Němec). 10.I., Vrchlabí, na Labi u autobusového nádraží 2 adult, a 2 juv. ex. (Miles). 8.IV., Vrchlabí, Výsplachy, pář staví hnizdo, samice seděla celý den na vejcích (Flousek). 10.IV., Staré Buky, pář, samice sedí na hnizdě (Mareček). 20.V., Vrchlabí, Výsplachy, pář + 4 mladé (Macháček). 30.VI., Vrchlabí, 6 ex. letělo nad Vrchlabím (Janalík). 19.VI., přelet 4 ex. od Vrchlabí k Lánovu (Flousek).

Husa (Anser ssp.) - 26.XI., Trutnov, H. Staré Město, k večeru přelet 30-40 ex. (German).

Kachna divoká (Anas platyrhynchos) - 11.III., H.Branná, Bohdanka, 5 ex., z toho 2 samci. Tamtéž 7.IV., 2 páry, 1 samec měl bílou, hnědě lemovanou hrud (barevná anomálie). Od 11.V. do 20.V. se tamtéž zdržoval 1 par. Samice nakladala skoro každý den vejce, které bylo druhý den rozbité. 20.V., Vrchlabí, rybník ve Výsplachách, 4 samice a 27. juv. (vše

Macháček). 21.V., Upsilon rašelina, hnízdo s 5 vejci. 25.VI., tamtéž samice se 7 pull. (Chutný). 18.V., Hostinné, Sejfský potok, samice s 8 pull., druhý den již jen 3 pull. (Lejdář).

Círka obecná (Anas crecca) - Vrchlabí, rybník u letiště, 22.III., 1 pář. (Flousek).

Lžičák pestřý (Anas clypeata) - 22.III., rybník u letiště ve Vrchlabí, 2 samci + 1 samice (Flousek). 26. a 27.IV. a 1.V., H. Branná, Bohdanka, 1 samec. (Macháček).

Polák chicholatý (Aythya fuligula) - 27.IV., Vrchlabí, Vysplachy, 3 samci. 28.IV. tamtéž 1 samec a 5.V. tamtéž 2 samci a 1 samice (Macháček).

Hohol severní (Buceros clangula) - 27.IV., Vrchlabí, Vysplachy, 1 samec (Macháček).

Kajka mořská (Somateria mollissima) - 5.V., Vrchlabí, rybník u letiště, 1 samice sbírala potravu. 12.V., přítomna tamtéž, pořízena fotodokumentace (Flousek, Krkonoše XXIII: 14, 1990).

Luňák červený (Milvus milvus) - 10.IV., Staré Buky, 1 ex. ve výsi na preletu, kam k němu vystoupaly 2 káně lesní (Mareček).

Kraňujec obecný (Accipiter nisus) - 22.I., Prosečné, 1 samec seděl u něz hrabosů a pokoušel se o jejich lov (Grúz).

Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) - 24.II., Trutnov, Horní Staré Město, pozorovan tok (Mareček).

Káně lesní (Buteo buteo) - 14.IV., Prosečné, pozorován 1 ex., který měl v obou křidlech 3. nebo 4. letku úplně bílou (Grúz).

Orel skalní (Aquila chrysaetos) - Přelet 1 ex. patrně tohoto druhu 24.VI. od Sněžky ke Studniční hoře (Chutný).

Orel křiklavý (Aquila pomarina) - 14.V., Rýchory, Sokolka, přelet 2 ex. (Hofmann + Svoboda).

Moták lužní (Circus pygargus) - 8.III., Prosečné, přelet 1 ex. severním směrem, o 1/2 minuty později letěl další ex. stejným směrem (Grúz).

Moták pilich (Circus cyaneus) - 5.XI., Prosečné, nad strništěm s pedsevem jetele lovil samec. Ulovil hraboše, kterého hned na místě zkonzumoval. Tamtéž 10.XI. pozorována 1 samice (Grúz). 12.X., Lahrbush, přelet 1 ex. k západu (Flousek).

Moták pochop (Circus aeruginosus) - 25.VIII., Vízov, 1 juv. ex. nebo samice (Flousek). 20.III., Vrchlabí, rybník u letiště, 1 samec odletěl směrem ke Strážnému (Grúz).

Ostříž lesní (Falco subbuteo) - 31.V., přelet 2 ex. od Lahrové ke Klínovému potoku. 25.VI., přelet 1 ex. od Růžové hory k Obřímu dolu (Flousek).

Poštolka obecná (Falco tinnunculus) - 1990, Proseč-

ná, vyhnízdění ve 2 budkách z umělé lamy (Gruž).

Tetřev hlubec (Tetrao urogallus) - 9.III., 23.II. a 5.XI., Rychory, Pušovka, pozorovan při přijímání potravy a tamtéž 18.III. při toku vždy 1 kohout. 25.IV., Sklenářovice, 1 kohout při toku. 20.V., Rychory, plamna, pozorován při přeletu 1 kohout a 20.I., tamtéž rovněž 1 kohout. 8.VII., přelet 1 slepice u Sokolky. 25.IX., Rychory, hřebenová cesta (tetřívčí louka), spatřen 1 kohout (vše Balcar a členové MS Svoboda). 28.III., Rychory, Kutiň, 3 samci (Flousek). 27.III., Rychomy, Sokolka, tetřevinec, stav 10 kohoutů + 11 slepic, z toho 3 adultri (Hofmann). 1990, vyhnízdění tetřeva na hlubce ve volnosti na Rychorách. Nález peří z tetřevího kuřete, které bylo asi otráveno po postřiku Actelikem (Hofmann). Myslivecká sdružení na okrese Trutnov nahlásila výskyt 11 ks tetřevů (MS Líčná Olešnice - 1 ks, MS Poříčí - 5 ks, MS Svoboda - 5 ks) - Diviš, Navrátil.

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) - 22.V., Pančavská a Labská louka, tok místně 9 samců (Flousek). Lesní závody a MS na okrese Trutnov nahlásily výskyt 107 ks. Z toho LŽ - 105 ks, MS Poříčí 3 ks, MS Svoboda 2 ks. (Diviš, Navrátil). Poznámka: Uvedené kmenové stavy tetřeva a tetřívka pro okres Trutnov jsou v Prunelle 1989 ohynelem uvedl pro rok 1989 (Miles).

Křepelka polní (Coturnix coturnix) - VI., Rychory-Ozén, hlas 1 samec (Ptácek). 1990, louky mezi Vrchlabím a Lánevem, v době hnězdění volávají samci na třech místech (Vávra).

Bažant obecný (Fasianus colchicus) - I., Vrchlabí, občka Strážné, denně na zahradě v kroví a hustých bylinách nocuje 7 slepic a 2 kohouti (Vins).

Chřástal polní (Crex crex) - 3.VI., Horní Maršov, směr Rychorská bouda, 550 m n. m., 13.VI., Hlubecí bouda, 800 m. n. m., 14.VI., Peč p. Sn., Žižková bouda, asi 1000 m n. m., 30.VI., Markoušvice, 600 m n. m., vždy 1 vclající ex. (Miles). 5.VI., Peč p. Sn., Mělnická bouda, přes 1000 m n. m., hlas samce (Flousek).

Slípka želenonohá (Gallinula chloropus) - 10.IV., Staré Buky, 1 pář (Mareček).

Lyska černá (Fulica atra) - 27.IV., Vrchlabí, Vysplachy, 6 ex., 20.V. tamtéž 14 pull., 28.IV., rybník u letiště, 7 ex., 5.V. tamtéž 6 ex. + 1 samice na hnězdě, 20.V. tamtéž 18 mladých (vše Macháček). 19.II., rybník u letiště ve Vrchlabí, 1 ex. (Flousek).

Kulík říční (Charadrius dubius) - 8.IV., Vrchlabí, rybník u letiště, 3 ex. (Flousek). 24.IV., tamtéž, 12 ex., 5.V., tamtéž, naznaky toku u 10 párů (Macháček). 15.V.-5.VIII., Krabašov, zemědělský objekt na severním svahu Kožince, 15.V.-15.VI. 2 ex., denně, od 15.VI. pozorován jen 1 ex., 5.VIII., tamtéž 3 ex. - 2 adultri + 1 mládě (Novotný). 21.VII.; Hostinné, 1 ex. u splavu u Stavbních izolací (Lejdar).

Sluka lesní (Scolopax rusticola) - 17.III., Svoboda n. U., první tohorocní pozorování (Balcar). 22.III., Vrchlabí, 2 ex. (Flousek). 15.II., Moravská Sobota, nález 1 pořádného ex., donesena do muzea ve Vrchlabí (Hamuš, Miles).

Bekasina otavní (Gallinago gallinago) - 13.VI., Pančavská louka, tuk sance (Flousek). 8.VI., tamtéž 1 ex. (Miles). 25.VI., Úpská rašelina, tuk sance (Flousek).

Pisík obecný (tringa hypoleucos) - 12.VI., Horní Olešnice, na poli u malé karloše 1 ex. (Griz).

Vodouš bahenní (Tringa glareola) - 2. a 3.IV., Horní Branná, Bohdanka, 1. ex.; 28.V., Vrchlabí, rybník u letiště, 2 ex. (Macháček).

Vodouš kropenatý (Tringa melanopterus) - 7.IV., Trutnov-Poříčí, "mrtvé jezero", 2 ex. (Balcar). 8.IV., Vrchlabí, rybník u letiště, 1 ex. (Flousek). 10.IV., Staré Bulky, 1 ex. (Mareček). 28.IV., Vrchlabí, rybník u letiště, 4 ex. (Macháček). 25.VI., Úpská rašelina, 1 ex. (Chutný).

Racek chechtavý (Circus ridibundus) - 24.I., Vrchlabí, 20 ex. (Flousek). 27.I., Trutnov, nad Úpou u nádraží ČSD asi 20 ex. (Miles). 2.VIII., Hostinné, 4 ex. na Labi; tamtéž nalezen 11.VII. 1. unijní ex. (Lejdar).

Holub hřivnáč (Columba palumbus) - 2.IV., přelét 5 ex., u Lysé hory (Motycka),

Holub douřňák (Columba oenas) - 31.I., Horní St. Město, "Peklo", 1 ex., vylét z dutiny v sakue, která byla v roce 1989 obsazena sýcem rousným (Mareček).

Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) - 27.XII., H. Marsov, na krušťko přilétávající v č. (Hofmann, Miles).

Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) - 7.V., až 16.VI., H. Branna, Bohdanka, výsily v páru (Macháček).

Puštík obecný (Strix aluco) - 1990. Prosečné a okolí, obsazeno 6 budk z umělého hroty, mláďata úspěšně vyvedena z pěti hnízdců (Grúz).

Sýc rousný (Aegolius funereus) - 28.VI., Horní Misečky, chycena a kroužkovana samice s knížání nažinou (Miles, Flousek).

Výr velký (Bubo bubo) - 5.I., Arnultovice, lom, nalezen vývržek vyra obsahující části kostry tchóře tmavého a vícekrát zbytky ježků (kůže s bočinami) - Lejdar. 13.III., Vlčice, hlas vyra (Lareček).

Kalous ušatý (Strix aluco) - 1990. Prosečné, vyhnízdění v budce pro poštovky z kanystru. Vyvedena z mláďata (Grúz).

Kukačka obecná (Cuculus canorus) - 7.V., Svoboda n. U., poprvé hlas, nejdříve ze sledovaných posledních 10 let (Balcar). 3.IX., Dolní Lanov, přelét 1 ex. Sedé horou od SV k JZ (Grúz).

Roryš obecný (Microtus apodus) - 10.V., Svoboda n. U., přelét nejdříve za 10 sledovaných let, odlet 29.VIII. (Balcar).

Ledňáček říční (Alcedo atthis) - 26.VIII., Martinice, rybník, 1 ex.; Vrchlabí, rybník u letiště, 2.IX. 1 ex. (Macháček). 23.X., Špindlerův Mlýn, nádraží ČSAD, 1 lovící ex. (Flousek). 25.XI., Dolce, 1 ex. (Cerman).

Dudek chocholatý (Upupa epops) - Rýchory, Antonínův údolí, u koupaliště 1 ex. (Balcar).

Žluna zelená (Picus viridis) - 19.VI., Hostinné, školní AZ, 2 ex. na omítce školy (Lejdar).

Žluna šedá (Picus canus) - 17.III., Hostinné, volání 1 samce (Miles). 13.V., Trutnov, H. Staré Město, 1 samec (Mareček). 8.VII., Hostinné, na balkon školy AZ přilétal 1 pář (Lejdar).

Datel černý (Dryocopus martius) - 6.IV., ozývá se z bukového lesa (s. dutinami) nad Rýzovištěm; 14. a 15.IX., Špindlerův Mlýn, Dřevařská cesta, přítomen (Motyčka).

Strakapoud malý (Dendrocopos minor) - 22.III., Vrchlabí, Výsplachy, 1 bubnující samec; Vrchlabí, zámecký park, 1 samec; 14.VIII., Přední Rennerovky, 29.VIII., Kyselý kout a 25.X., Slezské sedlo, vždy 1 ex. (vše Flousek), 12.VII., Úpská rašelina, 1 ex. (Chutný).

Krutihlav obecný (Jynx torquilla) - 5.V., Hostinné pod Poštákem, samice sedící na vejcích v ptáčí budce (Grúz). 11.V., Šerín, JZ svah, hlas 1 ex.; 16.V., Jakšín, údolí Kamenice, hlas 1 ex. (Flousek). 20.VIII., Rýchory-Ozón, 1 ex. (Ptáčková).

Lejsek malý (Ficedula parva) - 11.VI., Havírna, zpívající samec (Flousek). 4.VII., H. Maršov, směr Rýchoršská bouda, 1 varující a asi krmící ex. (Miles).

Pěnice viašská (Sylvia nisoria) - Prosečné, Šimkova rokle, 1 zpívající samec. Později již nepozorován (Grúz). 12.VI., Pilníkov, hnízdo se 4 mláďaty (Hlavatý).

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) - 25.IV., Vrchlabí, poprvé zpěv (Miles). 1.V., H. Branná, Bohdanka, pozorován pář, přílet (Macháček).

Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) - poprvé zpívající samec (Miles). 2.VI., Výrovka, 1 zpívající samec (Flousek).

Budníček menší (Phylloscopus collybita) - 17.III., poprvé zpěv samce (Miles).

Cvrčilka zelená (Locustella naevia) - 16.V., Harrachov, občivat, 1 zpívající samec (Flousek). 1990, H. Alberštejn, zpěv 1 samce před pokosením luk u chalupy (Pecina).

Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) - H. Branná, Bohdanka, 2 ex., přílet. Tamtéž 16.V. skoro dostavěné hnízdo a 30.V. 4 vylétlá mláďata (Macháček).

Drozd kvičala (Turdus pilaris) - 26.II., Vrchlabí, zámecký park, 1 ex. chovající se jako již na hnízdišti

(Miles). 30.V., Černá hora, Sokolská bouda, 1 ex. s potravou v zobáku (Flousek). 19.VI., H.Alberice, nález hnizda s mládety (Hlavatý). Tamtéž, dost kvíčal proti jiným létům, kolem chalupy 2-3 páry (Pecina). 13.VIII., Vrchlabí, zámecký park, 1 ex. s potravou v zobáku (pozdní hnizdění); 22.X., přelet asi 200 ex. na Rýchorách u Sokolky; 25.X., Vrchlabí, přítomno hejno asi 300 ex. (vše Miles). 10.X.-17.XI., Horní Branná, v okolí se zdržuje asi 150 ex. (Macháček).

Drozd brávník (Turdus viscivorus) - 25.III., Vlčice, zpěv (Mareček).

Drozd zpěvný (Turdus philomelos) - 25.II., Vlčice, přílet (Mareček). 6.III., Svoboda n. U., přílet i zpěv, nejdříve za 10 let sledování (Balcar).

Drozd cvrčala (Turdus iliacus) - 12.III., Vrchlabí, letiště, 34 ex.; 26.I., Vrchlabí, zámecký park, 1 ex. (Flousek).

Kos černý (Turdus merula) - 2.V., H.Branná, Bohdanka, již mláde vylétlé z hnizda (Macháček).

Kos horský (Turdus torquatus) - 30.V., Černohorská rašelina, nález hnizda s mládety (Flousek).

Brambormíček hnědý (Saxicola rubetra) - 28.VI., H.Alberice, pár krmí vyvedená mládata. Tamtéž 7.VII. dva páry krmí vyvedená mláďata (Hlavatý).

Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) - 14.IV. a 17.IV., Prosečné, pozorován 1 ex. (Grůz).

Modrák obecný tundrový (Luscinia svecica svecica) - 28.VI., rašelinistě pod Tvarožníkem, 1 zpívající samec. 14.VII I., Úpská rašelina, 1 juv. ex. bez kroužku (obojí Flousek). Na Pančavské louce a Úpské rašelině odchyceno 31 samců a 20 samic (Chutný).

Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) - 19.III., H.Branná, Bohdanka, přílet 1 ex. (Macháček). 24.XI., Klášterská Lhota, na drátech 1 samec (Grůz).

Pěvuška podhorní (Prunella collaris) - 15.VI., Pančavský vodopád, 1 ex. s potravou v zobáku; 25.VI., vrchol Sněžky, 4 adultní ex. (obojí Flousek).

Pěvuška modrá (Prunella modularis) - 13.V., Vrchlabí, hnizdo s 5 vejci ve skalní štěrbině v kamenné stěně u Labe (Miles).

Skorec vodní (Cinclus cinclus) - 13.V., Vrchlabí, u Tesly, léta s potravou v zobáku do nepřístupného náhonu, kde krmí mladé v hnizdě (Miles). 7.IX., Špindl. Mlýn, soutok Labe s Dlouhým potokem, 1 ex. ulovil asi 7 cm dlouhou rybku, třískal s ní o zem, až se přestala pohybovat a pak jí polkl hlavou napřed a dlouho se protahoval, aby jí dostal až do žaludku (Motyčka).

Tuhýk šedý (Lanius excubitor) - 3.I., Hostinné, Hlinák, 1 ex.; 10.-11.XI. a 22.XII., Prosečné, Labská stráň, 1 ex. (Grůz).

Tuhýk obecný (*Lanius collurio*) - 19.VI., H. Alberice,
2 hnizda s vejci a 1 s mladaty (Hlavatý).

Sýkora modřinka (*Parus caeruleus*) - 21.III., Vrchlabí,
jíž nosí stavební materiál na hnizdo v budce na okně.
Tamtéž 30.V. vyvádějí mladé (Němec).

Moudivláček lužní (*Remiz pendulinus*) - 8.IV., Vrchlabí,
rybník u letiště, 3 ex. (Flousek).

Brkoslav severní (*Bombycilla garrulus*) - 6.I., Stráž-
né, náměstí, 1 ex. (Flousek), 9.I., Hostinné, na jeřabí-
nách a na televizní anténě na sídlišti 20 ex., tamtéž 13.
I. 50 ex. (Miles), 5.IV., Harrachov, 7 ex. ozobávalo čers-
tvě vyražené pupeny jehlič na modřinu (Motyčka). 22.II.,
Vrchlabí, u muzea na smrku 15 ex. (Miles). 2.XII., Hostin-
né, na televizní anténě na sídlišti 30 ex. (Miles). 9.XII.,
Vrchlabí, 15 ex. (Grúz). 11.-12.XII., Vrchlabí, 80 ex.,
po zahradačích pabírují jablka, 23.XII. tamtéž 50 ex. (Ně-
mec). 17.XII., Horní Mísečky, velké hejno (Pokorný). 3.
III., Svoboda n. U., 12 ks na jabloni (Balcar). Huntířov:
8.I. - 6 ex., 10.I. - 10 ex., 18.I. - asi 50 ex., 2.XII.
- 1 ex., 12.XII. - 10 ex., 13.XII. - 3 ex., 16.XII. - 1
ex., 23.XII. - 4 ex. (vše Hlavatý).

Vlaštovka obecná (*Hirundo rustica*) - 18.IV., H. Branná,
1 pář, přilet (Macháček). 25.IV., Vrchlabí, přilet (Miles).
27.IV., Vrchlabí, přilet (Němec). 2.V., Svoboda n. U., pří-
let, nejdříve z 10 sledovaných let, odlet 20.IX. (Balcar).

Jiříčka obecná (*Delichon urbica*) - 25.IV., H. Branná,
Bohdanka, přilet 2 ex. (Macháček). 2.V., Svoboda n. U.,
přilet, nejdříve za 10 sledovaných let, odlet 20.IX. (Bal-
car), 30.VIII., Prosečné, 19 hod., na drátech elektrického
vedení u travína asi 300 ex. (Grúz).

Dlask tlustozobý (*Coccothraustes coccothraustes*) -
23.V., Spindlerovice, 2 ex., Luční bouda, přelet 3 ex.
(Flousek).

Zvonek zelený (*Chloris chloris*) - 1990, H. Alberice,
častěji výskyt než v jiných letech (Pecina).

Stehlík obecný (*Carduelis carduelis*) - 1990, H. Albe-
řice, častěji výskyt než v jiných letech (Pecina). 17.-
20.VIII., Horní Mísečky, asi 30 ex., poprvé v tak vysokém
počtu za 9 sledovaných let (Miles). 7.IX., Špindl, Mlyn
pod Švýcarskou dvorcem na bodlácích 12 ex. (Motyčka).

Čečetka zimní (*Carduelis flammea*) - 11.I., Vrchlabí,
nad muzeem asi 25 ex. (Miles). 7.IV., Trutnov-Poříčí,
"mrtvé jezero", několik ex. na jívách mezi zpívajícími
číňky a stehlíky (Mareček). 15.V., Harrachov, informační
středisko TES 3, 2 zpívající samci (Flousek). 29.XI., Pro-
sečné, Šimková rokle, 1 ex, na bríze (Grúz). 1.XII., Krá-
lovec, několik kusků hejnko na plevelech, kde byli též
hýli obecní (Mareček).

Čečet lesní (*Carduelis spinus*) - 28.I., Hostinné,
hejno 350 ex., největší v tomto roce (Grúz).

Zvonohlík zahradní (*Serinus serinus*) - 22.II., Vrchlabí, zpívající samec (Flousek).

Hýl rudý (*Carpodacus erythrinus*) - 14.VI., Pec p. Sr., Žižkova bouda, zpěv 2 samců; 8.VII., H. Mísečky, ještě zpěv samce (Miles). 1990, H. Alberice, v celém údolí jich bylo přiměřeně jako každoročně (Pecina).

Pěnkava obecná (*Fringilla coelebs*) - 3.I., Vrchlabí, 1 samice (Vávra). 27.II., H. Branná, ves, přílet (Macháček).

Pěnkava jikavec (*Fringilla montifringilla*) - 26.X., Slezské Sedlo, 1 ex., Špindl. Mlýn, nádraží CSAD, 1 ex., Vrchlabí, více ex. (Flousek). 3.II., Vrchlabí, 5 ex. (Pokorný). 2.III., Trutnov, H. Staré Město, několik ex. mezi pěnkavami obecnými (Mareček).

Strnad obecný (*Emberiza citrinella*) - 27.VI., H. Mísečky, nález hnízda s 5 vejci. 1 m vysoko na smrku (Miles).

Strnad zahradní (*Emberiza hortulana*) - 1.V., Úpská rašelina, 1 ex. sbírající potravu na sněhu (Chutný).

Strnad rákosní (*Emberiza schoeniclus*) - 28.IV., Vrchlabí, rybník u letiště, 1 pář; 5.V., tamtéž 2 páry (Macháček).

Vrabec polní (*Passer montanus*) - 24.III., H. Branná, Bohdanka, nález 2. hnízd s celkem 8 mláďaty pod zastřešením z vlnitého plechu, první hnízdění v tomto roce (Macháček).

Skřívač polní (*Alauda arvensis*) - 15.-16.II., Vrchlabí, první přilety (Vávra). 19.II., Špindl. Mlýn, Labská, 1 ex. na zemi (Mareček). 24.II., Trutnov, H. Staré Město, přílet (Mareček). 25.II., Svoboda n. U., přílet; 5.III., tamtéž, zpěv. Nejdříve za 10 let sledování (Balcar).

Linduška lesní (*Anthus trivialis*) - 2.IV., zpívá na více místech, např. u Lysé hory (Motyčka).

Linduška horská (*Anthus spinolella*) - 8.IV., Vrchlabí, rybník u letiště, 13. ex. sbíralo potravu (Flousek).

Konipas luční (*Motacilla flava*) - 28.IV., Vrchlabí, rybník u letiště, 14 ex. (Macháček). 1.V., Úpská rašelina, 1 ex. Mot. fl. thunbergi spolu s Mot. fl. flava, sběr potravy na sněhu (Chutný).

Špaček obecný (*Sturnus vulgaris*) - 13.II., Vrchlabí, 1 ex. na knoflíku na okne za snežení; 19.II., Vrchlabí, na stromech u domu 15 ex. (Hěnec). 18.II., Čermná, skládka, hejno 43 ex. (Grůž). 24.II., Vrchlabí, hejno špačků na louce (Vávra), 25.II., Vlčice, přílet (Mareček). 10.III., Svoboda n. U., přílet, nejdříve za 10 sledovaných let, zpěv 13.III., odlet 20.VIII. (Balcar). 11.III., H. Branná, přílet (Macháček).

Krkávec velký (*Corvus corax*) - 2.II., Růžohorky, 1 ex.; 23.II., Trutnov, H. Staré město, pář. Tamtéž 9.V. hnízdo se 3 pull. před vyvedením, 13.V. 1 pull. mimo hnízdo, 15.V. všechna pull. mimo hnízdo; 2.XII., 2 ex. (vše Mareček).

18.III., Hostinné, městský les, přelet 3 ex. (Miles). 22.III., Lučiny, Pec p. Sn., 3 ex. (Kubíček). 2.IV., H. Bran-
ná, Bohdanka, 2 ex. (Macháček). 2.IV., východně od Harra-
chova, na krkavce dorážela v letu vrána šedá (Motyčka).
27.IV., Vrchlabí, Výsplachy 2 ex. (Macháček). 10.V., Ji-
lemnice, 1 ex. (Janalík). 15.V., Trutnov, H. Staré Město,
za Texlenem, 2 mladí krkavci u hnizda. 27.V., Horní Staré
Buky, 2 ex., tamtéž 23.VII. 4 ex. (vše Černan). 28.VII.,
13 hod., 10 ex. kroužilo ve výši (Miles). 27.IX., Janova
hora, 3 ex. (Pokorný). 8.X., Markoušovice, 2 ex. nad lesem
(Miles). 1990, H. Alberžice, rodina krkavců létala na pokra-
cené louky (Pecina).

Havran polní (Corvus frugilegus) - 27.II. a 3.III.,
Vrchlabí, hrzonadný tah havranů (Němec).

Straka obecná (Pica pica) - 15.III., Pilníkov, pář do-
stavuje hnízdo (Mareček).

Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) - 4.VIII.,
nad silnicí Lánov-Cista, 1 ex.; 10.X., Vrchlabí, 1 ex.;
10.XI., Prosečné, 1 ex. (vše Grůž). 8.X., Pilníkov, 1 ex.
v ovocném sadu (Mareček). 8.X., Markoušovice, 2 ex. nad
chalupami (Miles). 1.IX., Paseky n. J., skupina 12 ex. le-
tá po ořechách (Stěpánek).

Sojka obecná (Garrulus glandarius) - 10.X., Rudník,
pošta, skupina 20 ex. v povosotech hnízdu (Lejdar).

Ze zpráv jednotlivých pozoro-
vatelů zpracoval

RNDr. Petr Miles

Správa KRNAP, Vrchlabí

SOUHRN PUBLIKACÍ V PRUNELLE V LETECH 1975-1989

(kromě Přehledů ornitologických pozorování v ročnících
1985-1989)

ADAM, I., 1977: Zimní výskyt a jarní průtah ptáků v okolí
Vrchlabí. III, 2: 8-13.

ČERVA, I., PILOT, L., 1985: Říjen v hřebenovém sedle u Ve-
secké boudy. III: 17-20.

ČIHÁK, K., HAVLÍČKOVÁ, A., 1980: Maďarská pusta. VI, 2:
16-18.

FIKEJZ, M., 1981: Odchov tetřeva hlušce (*Tetrao urogallus*
L.) na Rýchorách. VII, 2: 17-18.

FLOUSEK, J., 1983: Bahňáci (*Charadriiformes*) v Krkonoších
v roce 1983. IX: 12-14. 1984: Ornithologická pozorová-
ní v oblasti Krkonoš v roce 1984. X: 8-10. 1984b:
Hnízdění moudivláčka lužního (*Remiz pendulinus*) v Kr-
konoších, X: 10-11.

- FLOUSEK, J., KROMÁDKO, M., LNĚNIČKOVÁ, V., 1984: Expedice "Falco", 30.VI.-14.VII.1984. XI: 23-26.
- FLOUSEK, J., LNĚNIČKOVÁ, V., 1985: Expedice "Gypaetus(Gurnán)", 29.6.-13.7.1985. XI: 21-23.
- FLOUSEK, J., LNĚNIČKOVÁ, V., ŠTURSOVÁ, H., KALENSKÝ, J., 1983: Expedice "Egretta", 2.-17.VII.1983. IX: 21-25.
- GRUZ, J., 1975a: Dřemlík tuňdrový (*Falco columbarius*).
I: 10. 1975b: Některé zkušenosti s vyvěšováním a kontrolami ptačích budek. I: 14-16. 1976: Ledňáček říční (*Alcedo atthis*) a jeho výskyt v Krkonoších a Podkrkonoší. II: 3-5. 1977: Výsledky sčítání kachen na Labi. III, 2: 14-17. 1978a: Některé základní pokyny pro kroužkování mláďat. IV, 1: 14-18. 1978b: Hnízdění sýkory koňadry (*Parus major L.*) v Prosečné. IV, 2: 4-8. 1978c: Výsledky odchytových akcí členů sekce. Rákosina Pilníkov III. IV, 2: 16-17. 1979: Linduška luční (*Anthus pratensis*) a její průtah na malé rákosině v Dolním Lánově, okres Trutnov. V: 5-8. 1980: Méně obvyklý výskyt ptáků v zimním období v Prosečném a v Hostinném nad Labem. VI, 1: 8-9. 1981a: Početnost výskytu skřivana polního (*Alauda arvensis L.*) v Podkrkonoší. VII, 2: 5-9. 1981b: Populační hustota káně lesní (*Buteo buteo L.*) v Podkrkonoší. VII, 2: 9-10. 1981c: Výskyt moudivláčka lužního (*Remiz pendulinus L.*) v rákosině u Pilníkova (okres Trutnov). VII, 2: 15-16. 1983a: Strakapoud bělohrbety (*Dendrocopos leucotos*) v Podkrkonoší. IX: 14-15. 1983b: Výskyt orlovce říčního (*Pandion haliaetus*) v Prosečném v roce 1981. IX: 19-20. 1985a: Vzácné pozorování pěnkaváka sněžního (*Motacilla nivalis L.*) v Podkrkonoší. XI: 9-10. 1985b: Druhové složení potulkových hejn sýkor v Podkrkonoší. XI: 10-12. 1988: Kvalitativní složení ptačí synusie 1 hektaru smíšeného lesa v Prosečném (o. Trutnov). XIV: 17-20.
- HARANT, K., 1980: Zklidnění čerstvě odchycených ptáků chlorpromazinem. VI, 2: 18-20. 1981: Krátkodobé zklidnění bažantů. VII, 2: 18. 1986: Úspěšné hnízdění sýčka obecného (*Athene noctua*) v zajetí. XII: 11-15.
- HLAVATÝ, L., 1989a: Příspěvek k rozšíření rorýse obecného (*Apus apus*) v budkách. XV: 23-25. 1989b: Zkušenosti s odchytom ptáků do jestřábího koše. XV: 25-26.
- HOLUBEC, F., 1977: Ornitologické zajímavosti ze Semilska. III, 1: 5-6.
- HROMÁDKO, M., 1979: Početnost a hustota osídlení ptáků v Orlických horách v letech 1978-1979. V: 21-24. 1983: Sýc rousný (*Aegolius funereus*) u Pardubických bud. IX: 18.
- HROMÁDKO, M., LNĚNIČKOVÁ, V., MAREČEK, M., 1982: Další zkušenosti s nočním odchytom na světlo v Krkonoších. VIII: 6-8.
- HŘÍBEK, M., 1979: Mezinárodní ornitologický kurs Serrahn

1979. V: 14-16. 1980a: Poznatky z akce Balt v Polské lidové republice. V, 1: 17-21. 1980b: Zpráva o akci Balt na poloostrovu Hel. VI, 2: 13-16. 1981: Baltic-ká akce u jezera Bukowo v PLR. VII, 1: 14-16. 1982a: Šuhýk šedý (*Lanius excubitor L.*) v Krkonoších. VIII: 11-12. 1982b: Bramborníček černohlavý (*Saxicola torquata L.*) na úbočí Zlatého návrší (1333 m n. m.) v červnu. VIII: 12-13. 1982c: Mladě lukačky obecné (*Cuculus canorus L.*) v Kotelních Jámách. VIII: 13-14. 1982d: Místopisné názvy s ornitologickou tématikou v Krkonoších. VIII: 16-18.
- JIRMAN, L., 1978: Některé poznatky z hnízdění rákosníka zpěvného (*Acrocephalus palustris*). IV, 1: 12-13.
- KALENSKÝ, J., 1980a: Výsledky zimního sčítání dravců v Podkrkonoší. VI, 2: 9-10. 1980b: Odchyt havranovitých ptáků, dravců a sov ve Vrchlabí. VI, 2: 11-12.
- KALENSKÝ, LAMPERT, VICH, MILES, HLÁVKA, 1980: Zajímavější ornitologická pozorování z okolí Vrchlabí v roce 1979. VII, 1: 9-10.
- KALOUSKOVÁ, M., 1978: Mé chovatelské zkušenosti. VI, 2: 11-12.
- KOUKOL, I., 1977: Ornitologické zajímavosti z údolní nádrže Rozkoš u České Skalice. III, 1: 6-7.
- KRAUSOVÁ, H., LNĚNICKOVÁ, V., MAREČEK, M., KROMÁDKO, M., 1980: Zpráva o prvním nočním odchytu pěvců v Krkonoších. VI, 2: 2-8.
- KUČERA, J., 1978: Studium krevních parazitů u ptáků cd-chytávaných v Krkonoších při akcích Balt. IV, 1: 18-21.
- KURC, J., 1978: Výsledky ornitologického průzkumu dunajské delty. IV, 2: 29-32. 1981: Upevnování ptacích budek. VI, 2: 21-23. 1983: Příspěvek k cologii sýkor modřinky (*Parus caeruleus*). IX: 20-21.
- KURC, J., ZAJÍČEK L., 1982: Expedice "Delta Dunarii". VIII: 19-23.
- LAMPERT, H., LNĚNICKOVÁ, V., 1978: Mezinárodní ornitologický kurs v Serrahnu. IV, 1: 10-11.
- LEMBERK, VL., 1986: Srovnání ornitocenů smrkových lesů Krkonoš podle stupně poškození ihličemi. XIII: 22-24.
- LNĚNICKOVÁ, V., 1978: Pozorování budníčka horského (*Phylloscopus bonelli*) v údolí Bílého Labe. IV, 1: 7-8.
- LNĚNICKOVÁ, V., MAREČEK, M., KROMÁDKO, M., 1982: Kos horský severoevropský (*Turdus torquatus torquatus L.*) v Krkonoších. VIII: 8-11.
- MACH, VL., 1986: Výsledky čtyřletého odchytu ptáků v osadě Žalý v Krkonoších. XII: 24-26.
- MATERNA, J., 1987: Poznatky ze zimního příkrmování ptáků v Hostinném. XIV: 10-16.

MILES, P., 1975a: Historie a současnost krkonošské ornitologie. I, 1-13. 1975b: Dřeňák tundrový (*Falco columbarius*). I: 19. 1975c: Husa indická (*Anser indicus*) v Krkonoších. I: 19. 1976a: Zpráva z činnosti sekce. II: 1-2. 1976b: Výskyt strnada zahradního (*Emberiza hortulana*) v Krkonoších. II: 14. 1977a: Bilance činnosti ornitologické sekce při Správě KRNAP za uplynulý rok 1976. III, 1: 2-3. 1977b: Kroužek ochrany přírody při Správě KRNAP ve Vrchlabí. III, 1: 10-11. 1977c: Zpravidlostí z akce Balt. III, 1: 11-14. 1977d: Přehled ptáků okroužkovaných v Krkonoších v roce 1976. III, 1: 18-20. 1977e: Bilance činnosti ornitologické sekce v roce 1977 a plán práce na příští rok. III, 2: 2-4. 1977f: Zemřel Emil Flégl. III, 2: 5-7. 1977g: Výzkumný úkol akce Balt. III, 2: 18-19. 1977h: Přehled ptáků okroužkovaných v Krkonoších v roce 1977. III, 2: 23-24. 1978a: 15 let Krkonošského národního parku. IV, 1: 2. 1978c: Předběžná zpráva o odchytu buďníčka horského (*Phylloscopus bonelli*) při akci Balt v Krkonoších. IV, 1: 8-10. 1978d: Bilance činnosti ornitologické sekce v roce 1978. IV, 2: 2-4. 1978e: Alce Balt. Výsledná zpráva za rok 1978 a plán na rok 1979. IV, 2: 13-15. 1978f: Přehled ptáků okroužkovaných v oblasti Krkonoš v roce 1978. IV, 2: 22-23. 1979a: Naše zkušenosti z odchytu havranů polních (*Corvus frugilegus*) ve Vrchlabí. V: 8-11. 1979b: Zemřel Antonín Kolář. V: 26. 1980a: Bilance činnosti ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku v roce 1979 a plán práce na rok 1980. VI, 1: 2-8. 1980b: Přehled ptáků okroužkovaných v oblasti Krkonoš v roce 1979. VI, 1: 25-26. 1980c: Zájemcům o účast na akci Balt v Krkonoších v roce 1980. VI, 1: 27-28. 1980d: Seznam členů a čekatelů ornitologické sekce a pravidelnějších účastníků akce Balt v Krkonošském národním parku. VI, 1: 29-31. 1981a: Bilance činnosti ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku v roce 1980 a plán na rok 1981. VII, 1: 2-3. 1981b: Přehled ptáků okroužkovaných v oblasti Krkonoš v roce 1980. VII, 1: 25-27. 1981c: Zájemcům o účast na akci Balt v Krkonoších v roce 1981. VII, 1: 27-28. 1981d: Bilance činnosti sekce v roce 1981 a plán práce na rok 1982. VII, 2: 2-5. 1981e: Expedice Džerman 1981. VII, 2: 23-29. 1981f: Přehled ptáků okroužkovaných v oblasti Krkonoš v r. 1981. VII, 2: 30-31. 1982a: Zpráva o akci Balt v roce 1982 a plán na rok 1983. VIII: 2-5. 1982b: Přehled ptáků okroužkovaných v oblasti Krkonoš v r. 1982. VIII: 29-30. 1983a: Zpráva o činnosti sekce v roce 1983. IX: 2-4. 1983b: Zpráva o akci Balt v roce 1983. IX: 4-8. 1983c: Straka obecná (*Pica pica*) osídluje Krkonoše. IX: 17-18. 1983d: Zemřel Karel Ouzký. IX: 28. 1984a: Zpráva o činnosti sekce v roce 1984. X: 2-8. 1984b: Dosavadní výsledky nočního pozorování a odchytu ptáků v Krkonoších. X: 12-16. 1984c: Zpětná hlášení ptáků z oblasti Krkonoš. X: 17-22. 1985: Přehled ptáků okroužkovaných v roce 1985 v oblasti Krkonoš. XI: 8-9. 1986: Zpráva

- o činnosti sekce v roce 1986. XII: 2-4. 1987: Zpráva z činnosti sekce v roce 1987. XIII: 2-4. 1988a: Zpráva z činnosti sekce v roce 1988. XIV: 2-4. 1988b: Úspěšná činnost kroužkovatelů v oblasti Krkonoše. XIV: 4-6. 1988c: Ptačí bučky evidované členy ornitologické sekce a výzkum jejich osídlení. XIV: 13-17. 1989a: Zpráva z činnosti sekce v roce 1989. XV: 2-6. 1989b: 15 let Oblastní ornitologické sekce při Správě KRNAP. XV: 16-23.
- MILES, P., HŘÍBEK, M., SMOLA, M., 1981: Ornithologické poznatky z expediče Carpathie 1980. VII, 1: 16-21.
- MILES, P., PICHLOVÁ, R., SIKORA, R., 1986: Expedice "Heddes" 12.7.-27.7.1986 do Rumunska. XII: 26-31.
- ELÍKOVSKÝ, J., 1981: Křídelní vzorec pěvusky modré (Prunella modularis /L./). VII, 2: 19-21.
- NĚMEC, M., KALENSKÝ, J., 1981: Z jarního tahu ptáků v Podkrkonoší. VII, 1: 24-25.
- NOVOTNÝ, B., 1976: Labutě v Krkonoších. II: 13. 1976b: Výskyt kachny divoké (Anas platyrhynchos) v oblasti západních Krkonoše. II: 10-11. 1977: Poslední lokalita tetřívka obecného (Lyrurus tetrix) na Jilemnicku. III, 2: 21.
- OUZKÝ, K., 1975: Ornithologické zajímavosti. I: 17-18. 1976a: Zajímavý příběh o kachně divoké a jejích káčatech ve Špindlerově Mlýně. II: 11. 1976b: Jarní průtah sýkor Špindlerůvym Mlýnem v roce 1976. II: 12. 1976c: Prvý výskyt syřka obecného (Athene noctua) u Špindlerova Mlýna. II: 13. 1976d: Zpráva o kroužku mladých ochránců přírody při Správě KRNAP v Klášterské Lhotě. II: 15-16. 1977a: První zjištěná přítomnost ptáků při jarním tahu 1976 ve Špindlerově Mlýně a v jeho okolí. III, 1: 4-5. 1977b: Zpráva o činnosti kroužku ochrany přírody při Správě KRNAP v Klášterské Lhotě. III, 1: 8-10. 1977c: Zpráva o mezinárodním ornitologickém kurzu v biologické stanici Serrahn v NDR. III, 2: 19-20. 1977d: Proč plení veverka ptačí hnizda? III, 2: 22-23. 1978: Výsledky odchyťových akcí členů sekce. Klášterská Lhota, Špindlerův Mlýn u Bedřichovského potoka. IV, 2: 20-21. 1979: Jiríčka obecná a obaleč modřínový. V: 25. 1980: Přílet severských ptáků do Krkonoše. VI, 2: 20-21. 1981: Jak to bylo se zdivočelymi holuby v Klášterské Lhotě. VII, 1: 23-24.
- PECINA, P., 1979: Aktivní metody ochrany ptactva. V: 2-5.
- PECINOVÁ, P., 1987: Hnízdění ptactva na naší zahradě v Horních Albeřicích. XIII: 17-24.
- PICHLOVÁ, R., 1986: Porovnání indexů druhové diverzity a denzity avifauny antropogenních biotopů v Hostimě. XII: 15-21.
- PROCHÁZKA, J., 1979: Naučná stezka v zámeckém parku ve Vrchlabí. V: 12-14. 1981: Rok 1981 v zámeckém parku ve Vrchlabí. VII, 2: 16-17.

- PTÁČEK, M., 1981: Zajímavější ornitologická pozorování z okolí Rýchor v roce 1980. VII, 1: 21-23.
- PTÁČEK, M., PTÁČKOVÁ, O., 1977: Strakapoud prostřední (*Dendrocopos medius*) na Rýchorách. III, 2: 22. 1978: Výsledky odchytových akcí členů sekce. Rýchory nad zotavovnou Ozon. IV, 2: 18-19.
- REDAKCE, 1977: Přírodovědné soutěže v kroužcích mladých ochránců přírody. III, 2: 7-8.
- REJMAN, B., 1984: Hnízdění čápa bílého (*Ciconia ciconia*) na okrese Trutnov. X: 11-12.
- REITMAJER, K., 1977: Kursy ornitologie v Přerově. III, 1: 16-18.
- RYBA, J., 1978: Ptáci jako hostitelé vnějších parazitů. IV, 1: 21-24.
- SALÁŠEK, V., 1981a: Modrák obecný tundrový (*Luscinia svecica svecica* L.) v Krkonoších. VII, 2: 10-13. 1981b: Dřemlík tundrový (*Falco columbarius* L.) v Krkonoších. VII, 2: 13-15. 1982: Ornitologické poznámky z pozorování v SPR Pančavská louka. VIII: 14-15.
- SIKORA, R., 1980: Výskyt skřivana ouškatého (*Eremophila alpestris*) v Mladých Bukách. VI, 1: 11-12. 1985: Výsledky sledování ptactva v zimním období v oblasti Mladých Buků. XI: 12-17.
- SMOLA, M., 1980: Zpráva o činnosti ornitologického kroužku při ODPM Trutnov. VI, 2: 22-23. 1982: Expedice Lácerta 1982. VIII: 23-29.
- SMOLA, M., JUSTOVÁ, I., 1983: Odchyt ptáků pomocí reflektoru při akci Balt v Krkonoších. IX: 8-11.
- SMRČEK, M., 1981: K zaklecování ptáků. VII, 1: 13-14.
- SMRČEK, M., MALINA, J., 1981: Několik slov k modráčkově (*Luscinia svecica* L.) a kulíku hnědému (*Eudromias morinellus* L.). VII, 1: 10-12.
- SPRÁVA KRJAP, 1976: Zájemcům o účast na podzimní části akce Balt u Vosecké boudy. II: 18. 1977: Zájemcům o účast na akci Balt v Krkonoších. III, 1: 22. 1978a,b: Zájemcům o účast na akci Balt v Krkonoších. IV, 1: 26; IV, 2: 33.
- SVOBODA, J., 1977: Orel kříklavý (*Aquila pomarina*) a dřemlík tundrový (*Falco columbarius*) zastižení v hnízdním období v Krkonoších. III, 1: 4.
- ŠILHÁNEK, J., 1978: Ornitologické zajímavosti z Růžohorek. IV, 2: 9-10.
- VÁVRA, V., 1980: Co všechno můžete spatřit při akci Balt (jeřáb popelavý, *Grus grus*). VI, 1: 13-14.
- VEGER, ZD., 1983: Nové důležité úkoly chovatelů ptáků. IX: 25-27.

- VOLF, ZD., 1977: Ornithologické poměry v Orlických horách. III, 2: 25-26. 1978: Ornithologické zajímavosti z Orlických hor. IV, 1: 24-25. 1979: Dravci Orlických hor. V: 16-20. 1980: Zpráva o akci Balt v Orlických horách v roce 1979. VI, 1: 15-17.
- WEBER, H., 1976: Zajímavé výsledky z akce Pult. II: 16-17. 1985: Kníždění kulička hnědého (*Euodromias morinellus L.*) v Jeseníkách. XII: 23-24.
- ZAJÍČEK, J., 1980a: Některé ornitologické postřehy z okolí Jilemnice. VI, 1: 13. 1980b: Některé poznatky o avifauně státu Beneluksu. VI, 1: 22-24. 1983: Ornithologické zajímavosti z okolí Jilemnice. XII: 15-16.
- ZAJÍČEK, L., 1976: Výskyt ptactva v oblasti Dolců od 22. 11. do 14.3.1976. II: 6-9. 1978: Ornithologické poznatky z expedice Balkán 78. IV, 2: 24-29. 1986: Nalezení hnízda slavíka modráčka tundrového (*Luscinius svecica svecica*) na Rýchorách. XII: 32.
- ZAJÍČEK, L., KURC, J., 1978: Výsledky odchytových akcí členů sekce. Rákosina Pilníkov II a Staré Buky. IV, 2: 17-18.
- ZAJÍČEK, L., RAAB, S., 1977: Zpráva o dílčím výsledku akce Balt na Vosecké boudě v období 24.VIII.-4.IX.1976. III, 1: 14-16.

RNDr. Petr Miles
Správa KEMAP, Vrchlabí

POČETNOST VYBRANÝCH DRUHŮ PTAKŮ V KRKONOŠÍCH

V letech 1985-1989 proběhlo, i za účasti krkonošských ornitologů, další mapování hnízdního rozšíření ptáků v Československu. Získané poznatky budou využity nejen k využití změn v rozšíření a početnosti hnízdících ptáků v období od roku 1977 (předcházející mapování bylo organizováno v letech 1973-1977 a jeho výsledkem je publikace Šťastný-Randík-Hudec, 1987: *Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973-77*), ale rovněž k sestavení prvního celoevropského atlasu rozšíření ptáků. Součástí tohoto unikátního díla, v současnosti dokončovaného holandskou ornitologií, budou mimo jiné i odhady počtu hnízdících druhů ptáků v jednotlivých evropských zemích.

Neléhkým úkolem připravit požadované hodnoty pro ČSFR byli pověřeni koordinátoři celé akce, dr. Šťastný a dr.

Bejček. Jedním z podkladů, které mohly usnadnit lejtíci páření, byly i lokální odhady početnosti, zpracované pro členky geografické celky, mimo jiné i Krkonoše.

V následujícím výčtu předkládáme ohlédnutí početnosti vybraných druhů ptáků, hnízdících na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma (ca. 550 km²), sestavené na základě současných znalostí krkonošské avifauny. Početnost je udána v počtech hnízdících páru, s výjimkou tetřevovitých ptáků (v jedincích); otazníkem (?) jsou označeny pravdepodobně hnízdící druhy, jejichž hnízdění však nebylo prokázáno.

Přehled druhů

- Šáp černý (*Ciconia nigra*) - 5 až 7 páru
Včelojed lesní (*Pernis apivorus*) - 3 až 5
Orel křiklavý (*Aquila pomarina*) - 1 (?)
Rošťálka obecná (*Falco tinnunculus*) - 40 až 50
Ostříž lesní (*Falco subbuteo*) - 3 až 5
Sokol stěhovavý (*Falco peregrinus*) - 1 (?)
Dřeník tundrový (*Falco columbarius*) - 1 (?)
Jeřábek lesní (*Bonasa bonasia*) - 0 (v Krkonoších vymizel)
Tetřívek obecný (*Tetrao tetrix*) - asi 100 ks.
Tetřev hlušec (*Tetrao urogallus*) - asi 20 ks.
Chřástal polní (*Crex crex*) - 15 až 20 páru
Bakasina stavní (*Gallinago gallinago*) - do 5
Pisík obecný (*Actitis hypoleuca*) - 5 až 10
Kulík hnědý (*Eudromias morinellus*) - 1 (?)
Holub doupňák (*Columba oenas*) - 5 až 10 (hrubý odhad)
Výr velký (*Bubo bubo*) - asi 5
Kulišek nejmenší (*Glauc. passerinum*) asi 5 (hrubý odhad)
Sýrcusný (*Aegolius funereus*) - asi 30
Ledňáček říční (*Alcedo atthis*) - asi 5
Krutihlav obecný (*Jynx torquilla*) - asi 10
Žluna šedá (*Picus canus*) - 20 až 25
Žluna zelená (*Picus viridis*) - 20 až 25
Datel černý (*Dryccopus martius*) - 50 až 70
Strakapoud prostřední (*Dendrocopos medius*) - 3 až 5
Strakapoud bělohlíbetý (*Dendrocopos leucotos*) - 1 (?)
Strakapoud malý (*Dendrocopos minor*) - 20 až 25
Skřivan lesní (*Lullula arborea*) - 5 až 10
Linduška luční (*Anthus pratensis*) - 1700 až 2000
Linduška horská (*Anthus spinoletta*) - 150 až 200
Pěvuška podhorní (*Prunella collaris*) - asi 10
Modráček tundrový (*Luscinia s. svecica*) - max. 40 až 45
Bramborniček hnědý (*Saxicola rubetra*) - 150 až 200
Brambor. černohlavý (*Saxic. torquata*) - asi 5 (?)
Kos horský (*Turdus torquatus*) - 200 až 250
Drozd kvíčala (*Turdus pilaris*) - asi 150
Drozd cvrčala (*Turdus iliacus*) - asi 5

Cvrčilka zelená (*Locustella naevia*) - 30 až 40
Cvrčilka říční (*Locustella fluviatilis*) - do 5
Buňiček horský (*Phylloscopus bonelli*) - 2 až 5 (?)
Buňiček zelený (*Phylloscopus trochiloides*) - 2 až 5 (?)
Lejsek malý (*Ficedula parva*) - 30 až 35
Lejsek černohlavý (*Ficedula hypoleuca*) - 250 až 300
Čřešník kropenatý (*Nucifraga caryocatactes*) - 25 až 30
Krkavec velký (*Corvus corax*) - asi 10
Čečetka zimní (*Carduelis flammea*) - 400 až 500
Hýl rudý (*Carpodacus erythrinus*) - 80 až 100

Početnost ostatních hnězdících druhů nebyla odhadována. U některých druhů je pro stanovení přesnějších hodnot stále nedostatek vhodných údajů, u běžně rozšířených druhů jsou početnosti ze sledovaného území Krkonoše (0,4 % rozlohy ČSFR) zanedbatelné ve srovnání s celou republikou.

Předkládaným, neúplným přehledem druhů však mapovací aktivity v Krkonoších nekončí. Na období 1991-93 je totiž naplánováno mapování hnězdího rozšíření ptáků v Krkonoších, s cílem doplnit chybějící údaje o rozšíření a početnosti všech hnězdících druhů našeho regionu. Všichni zájemci o spolupráci jsou srdečně vítáni, stejně jako veškeré upřesňující, opravující a doplňující údaje k uvedeným hodnotám.

RNDr. Jiří Flousek
Správa KRNAP
543 11 Vrchlabí

POZOR NA BUDNÍČKA ZELENÉHO (*PHYLLOSCOPUS TROCHILOIDES*) V KRKONOŠÍCH !

V posledních letech je v Krkonoších pravidelně v hnězdícím období pozorován méně běžný zástupce rodu *Phylloscopus*, budníček zelený - *Phylloscopus trochiloides* (Sundevall, 1838). Centrum jeho areálu rozšíření leží na Sibiři, odkud se druh začátkem tohoto století rozšířil dále na západ, po jihozápadním okraji Baltského moře i do Evropy. V současnosti registrovaná zvýšená frekvence pozorování ve středo-europských státech, včetně ČSFR, svědčí o tom, že šíření po Evropě dodud pokračuje,

Zpívající samci v Krkonoších jsou opakován každým rokem zastiženi na stejných lokalitách (především Důl Bílého Labe a Mumlavský důl), ve velmi podobných typech prostředí (husté, mladší smrkové porosty na březích horských toků). Vhodných biotopů je na celém území Krkonoš relativně dost, a proto využíváme podrobnějšího popisu dvou pozorování budníků zelených v roce 1989 jako upozornění ornitologům, pracujícím v Krkonoších, na možný výskyt tohoto zajímavého druhu i na dalších lokalitách.

Pozorování A

Datum: 27.6.1989, 8.10-8.22 hod.

Lokalita: Mumlavský důl nad Harrachovem, u turistické cesty směrem k Vosecké boudě, asi 300 m od asfaltované svážnice podél Velké Mumlavy, 1080 m n. m.

Prostředí: rozsáhlá holina zhruba z jedné třetiny zarostlá velmi hustou výsadbou smrků ve stáří 10-15 let a lemovaná smrkovým porostem ve stáří 40-100 let.

Zpěv: hrubá transkribce "tý (tý) tydli tydli tydlili", hlásky v transkribci uvedené jako "t" přitom zněly jako mezi "t" a "č".

Samec byl pozorován ze vzdálenosti 20-50 m ve smrkové mlazině (vzhledem připomínal budníčka menšího, proti obloze však nebylo možno rozoznávat podrobnější znaky), zpíval z vrcholů smrčků, při zpěvu natahoval krk kupředu (ohvílení to působilo až komicky), při přeletech ze stromu na strom připomínal charakterem letu lejska.

Pozorování B

Datum: 10.7.1989, 10.15-10.20 hod.

Lokalita: údolí toku protínajícího Vodovodní cestu ze Špindlerova Mlýna na Horní Misečky, asi 1,5 km od centra Špindlerova Mlýna, 880 m n. m.

Prostředí: velmi hustá přítoky vegetace s převahou smrku ve stáří zhruba 30 let, v okolí smrkové porosty ve stáří 40-80 let.

Zpěv: stejný jako v předchozím případě, pravidelně opakována výše transkribovaná sloka.

Zpívající samec byl nejprve slyšen a pak i pozorován ze vzdálenosti asi 50 m. Zpíval na vrcholu asi 15 m vysokého smrku, po vyrušení se snesl k zemi, připojil se k němu i druhý exemplář a oba přeletovali kolem pozorovatele. Varovali "tydli.tydli" (viz výše), samec občas krátce zazpíval, po 5 minutách oba exempláře zmizely a ztichly. Přestože se oba ptáci pohybovali velmi blízko (asi 5 m), díky hustému podrostu a rychlému přemístování se dal zaregistrovat jen nápadný nadoční proužek; výrazná páska v křídle nebyla vidět.

Dosud evidované lokality:

- (1) celý Mumlavský důl od Mumlavské boudy proti proudu ke Krakonošově snídani,
- (2) údolí potoka protínajícího Vodovodní cestu mezi Špindlerovým Mlýnem a Horními Mísečkami,
- (3) celý Důl Bílého Labe od Dívčích lávek proti proudu k boudě U Bílého Labe (příp. i výše),
- (4) Zelený důl

Lze předpokládat, že zvýšená pozornost věnovaná tomuto druhu přinese i rozšíření uvedeného výčtu lokalit (včetně prokázání pravděpodobného hnízdění). Závěrem proto připojuji pár shrnujících upozornění. Při terénním pozorování nelze spolehat na morfologické znaky, běžně uváděné v určovacích klíčích (výrazný zelenavě žlutý nadoční proužek, žlutavá úzká pásek v křidle, tmavé nohy). Ke spolehlivému druhovému určení budníčka zeleného nejlépe poslouží především zpěv (připomíná zpěv střízlika nebo i pěvušky modré, transkribce viz výše, některé ptáky jsem transkriboval odlišně "cí crá rá (rá) cirirari"; pozornému ornitologovi nemůže uniknout "neznámý" a poměrně výrazný zpěv, bohužel často přehlušený blízkým hukotem vody) a charakteristické rysy chování (zpěv většinou z vrcholů stromů, natahování krku sedících sanců při zpěvu, "lejsčí" typ letu).

RNDr. Jiří Flousek
Správa KRNAP, Vrchlabí

MOJE ZKUŠENOSTI S ODCHOVEM PTAČÍCH MLÁĎAT (DROZD ZPĚVNÝ, KOMÍPAS HORSKÝ)

V přírodě jsou někdy nacházena opuštěná ptačí mláďata. Jejich rodiče mohli přijít o život a ptáčatům, která se ještě neumí sama živit, hrozí smrt hladem. K jejich záchraně nestačí často jen snaha a dobrá vůle, ale i nezbytné znalosti a zkušenosti.

První ptačí mláďata, která se mi podařilo již ve 12 letech s úspěchem "vypiplat" byli mladí drozdi zpěvní.

(*Turdus philomelos*).

Při pochůzce lesem jsem v červnu 1988 zaslechl ptáčí "žebrání". Podíval jsem se nad sebe a spatřil hnizdo žebrače zpěvného. Při jeho kontrole jsem zjistil, že v hnizdě jsou 2 mrtvá mláďata a 4 zbylá živá na mne hladově otvírala zobáky. Zůstal jsem u hnizda ještě hodnou chvíli, ale když staří ptáci nepřiletali, bylo zřejmé, že mláďata jsou hladová a opuštěná a je nutno je zachránit.

Vzal jsem tedy celé hnizdo s ještě nevzletnými mláďaty domů a v literatuře (PECINA, P., 1987: Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů, část 2, str. 102) jsem si vyhledal, jak se o ně starat. Zhotovil jsem podle návodu měkký žír (směs strouhaného vařeného vejce, syrové strouhané mrkve a strouhanky), kterým jsem mláďata pravidelně krmil. Mláďata rychle rostla a za tři tydny byla zcela samostatná. Zvykla si na mne tak, že za mnou popolétávala i venku, aniž by ulétla. Byla pak umístěna do voliéry na naučné stezce ve vrchlabském zámeckém parku a 2 z nich byly později puštěna na svobodu.

Odchov mladých drozdů považuji za vcelku snadný, ponějako tomu bylo v případě straky, racka a puštíka, o jejichž mláďata jsem měl možnost pečovat také.

Obtížnější úkol mi byl zadán v případě konipasa horského (*Motacilla cinerea*), jehož metodika chovu není ještě patrně dostatečně propracována. Bylo to pro potřebu ekologické expozice Kámen a život v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí, kde jsou pro model horského potoka požadováni krotci, od mládat odchovaní jedinci, které by návštěvníci expozice měli možnost dobře zblízka pozorovat.

K odchovu dvou asi týdenních mláďat, která mi byla v polovině června 1990 předána, jsem použil následujícího měkkého žíru: rohlík, tvrdý sýr, vařená vejce a jablka, vše nastrouháno a smícháno asi ve stejném poměru. Tento základ jsem obohatil 3 kapkami Combinalu A + D₃, což je vitaminový přípravek pro ptáky zakoupený v lékárně. Správná krmná směs vytvořila drobné hrudky, nesměla však být

mokrá ani suchá.

Zpočátku jsem krmil za pomocí pinzety každých 5 minut hrudkou žíru a přidával ještě 1 spařeného moučného červu a 2 spařené mravcní kukly. Později, když jsem se dozvěděl, že larvy potemníka moučného (mouční červi) způsobují při nadměrné konzumaci ptákům potíže (křeče a obrnu), jejich zkrmování jsem omezil.

Procentuální zastoupení jednotlivých složek krmiv bylo asi následující: 70 % měkký žír, 10% mrančích kukel, 5 % larev potemníka moučného a 15 % cvrčků domácích a různého nasmykaného hmyzu zbabveného trnitych nohou a jiných tvrdých částí.

K pití jsem podával ptáčatům kapátkem vodu. Ačkoliv toto někteří chovatelé nedoporučují, domnívám se, že to konipáskům prospívalo.

Čím byla mláďata starší, tím jsem prodlužoval intervaly krmení a zvyšoval jednotlivé dávky. Ve stáří 2 týdnů jsem krmil 1 x po 15 minutách dvojnásobnými dávkami než zpočátku. Ve stáří 3 týdnů již mláďata zkoušela sama přijímat potravu, ve stáří 27 dnů to již dokázala.

Ve stáří 30 dnů jsem konipásksky odnesl do muzea, kde byli vypuštěni do modelu horského potoka. Ukázalo se však, že to bylo ještě předčasné. Přijímali již sice sami potravu v klíčce, nedokázali ji však vyhledat v tak velkém objektu, jakým je model horského potoka. Z toho důvodu musela být znova odchycena a byla svěřena do péče tamním chovatelům. Jedno z mláďat jim sice uhynulo, druhé však žije dosud; je dokonale krotké a pro model horského potoka představuje výrazné oživení.

Martin Lejdar
Školní 321
543 71 Hostinné

P R U N E L L A

Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě
Krkonošského národního parku ve Vrchlabí

1990

Ročník XVI

Redaktor: RNDr. Petr Miles, CSc.

Redakční rada: RNDr. Jiří Flousek, Jan Grúz, RNDr. Petr
Miles, CSc.

Vydává Správa Krkonošského národního parku jako učelový
tisk. 150 výtisků, neprodájné.

